




CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT A
L'ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA.



MALALTIA	SÍMPTOMES	RECOMANA ASSISTIR A L'ESCOLA
FARINGITIS, PNEUMÒNIA	Febre i simptomatologia segons la malaltia	Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic
CONJUNTIVITIS BACTERIANA (PURULENTA)	Llagrimeig, congestió d'ulls, fotofòbia, inflamació de les parpelles	Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic
ERITEMA INFECCIÓS (Virus de la bufetada)	Exantema a galtes; a les 24h s'estén a braços, extremitats inferiors, natges i tronc	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
ESCARLATINA	Febre, angines inflamades, erupció a la pell	Fins 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic
ESTOMATITIS AFTOSA (Llagues a la boca)	Febre, vesícules i úlceres a la boca i llavis, dificultat per menjar	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
EXANTEMA SOBTAT	Febre alta amb durada de 3 dies, símptomes respiratoris. Cedeix la febre i apareix l'exantema a coll i tronc (1-3 dies)	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
DERMATITIS DEL BOLQUER	Irritació perineal	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
FONGS ALS PEUS	Picors a la nit, descamació i fissures al peu	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
GASTROENTERITIS VIRAL	Dolor abdominal, diarrea, vòmits.	Fins 48h després de la última diarrea o vòmit.
GRIP	Mal de cap, febre, malestar general, mal de coll i tos	Quan estigui sense febre i amb bon estat general
HEPATITIS A	Malestar, febre, nàusees, cansament i aspecte groguenc a la pell	Fins a 7 dies després que l'infant es posa groc
HEPATITIS B	Igual que Hepatitis A	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
MUGUET (Fongs a la boca)	Lesions blanquinoses a la mucosa oral i llengua	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
PAROTIDITIS (Galtes)	Dolor muscular, febre, mal de cap, tumefacció a les glàndules paròtides	Fins a 5 dies després d'iniciada la inflamació de la paròtide
POLLS	Picor i visualització directa de llémenes (ous) o del paràsit	Fins a iniciar el tractament. La presència de llémenes no és motiu d'exclusió
REFREDAT COMÚ	Llagrimeig, esternuts i malestar general	Pot acudir a l'escola si està sense febre i sense dificultat respiratòria
SALMONEL·LA i CAMPYLOBACTER	Diarrea amb sang, dolor abdominal, febre	Fins a indicació del metge o infermera
SARNA	Picors, principalment a la nit, amb vesícules a la zona dels plecs	Fins a realitzar el tractament
VARICEL·LA	Febre, erupció vesiculosa amb picor a cara, cos i extremitats	Fins a 7 dies després d'iniciada l'erupció o fins que totes les lesions estiguin en forma de crosta

XARAMPIÓ	Febre alta, tos, erupció a tronc, cara, coll i extremitats; conjuntivitis	Fins a 5 dies després del començament de l'exantema
MONONUCLEOSI INFECCIOSA	Faringitis, febre, ganglis, augment del fetge i melsa	Pot acudir a l'escola sempre i quan l'infant es trobi bé
IMPETIGEN	Lesions cutànies amb crostes de color groguenc	Fins a 24h després d'iniciar el tractament antibiòtic
MALALTIA BOCA-MÀ-PEU	Febre de 2-3 dies i aparició de l'erupció característica (petites vesícules a boca, mans i peus)	Pot acudir a l'escola sempre i quan no tingui febre ni salivera.

CAL TENIR EN COMPTE:

- En totes les malalties que cursen amb febre, a més de les recomanacions específiques per a cadascuna d'elles, cal que l'infant hagi estat 24h sense febre abans de tornar a l'escola. L'infant no ha d'assistir al centre si la malaltia impedeix que dugui a terme les seves activitats amb normalitat o requereix més atencions de les que els responsables a càrrec poden donar-li .
- Amb febre superior a 37,5 ° l'infant no pot assistir al centre. En el cas que presenti febre en horari escolar es trucarà a la família per tal que el vinguin a recollir i haurà d'estar 24h sense febre abans de tornar a l'escola.
- El centre no administrarà cap medicament sense recepta mèdica i document d'autorització de subministrament de medicament (penjat al web).
- L'infant no ha d'assistir al centre si presenta símptomes clars que afecten el seu comportament: febre, letargia, irritabilitat, plora constantment, respira amb dificultat o altres signes que evidencin una malaltia greu. No és correcte amagar aquests símptomes amb medicació ja que es pot transmetre la malaltia a la resta del grup i hi pot haver algun infant vulnerable.

Gràcies per la vostra col·laboració!

